




تعرض ضباط إنفاذ القانون التعرض لمرض كوفيد-19

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض تنفسي يمكن أن يكون حاداً ومهدداً لحياة بعض الأفراد. فهو مرض ينتشر بسهولة من شخص لآخر. وتوضح الإرشادات أدناه المعلومات المفيدة لموظفي إنفاذ القانون في تقييم التعرض لمرض كوفيد-19.



مستويات خطر التعرض للفيروس وما يجب مراعاته من إجراءات في الوكالة 3-1:

بحسب ما حددته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يتم تقسيم مخاطر التعرض للفيروس إلى تصنيفات تتراوح من عالية إلى لا شيء. وتوفر المعلومات الواردة أدناه إرشادات للوكالات لتحديد مخاطر التعرض للفيروس وتستعرض الإجراءات المفيدة للوكالات للأخذ بعين الاعتبار متابعة تعرض الموظفين لكوفيد-19.

التعرض مرتفع الخطر للفيروس بحسب مراكز السيطرة CDC

- الفحص المسبق: على أرباب العمل قياس درجة حرارة الفرد وتقييم الأعراض قبل بدء وريدياتهم.
- المراقبة المنتظمة: على الأفراد المراقبة الذاتية وفقاً لسياسة الصحة المهنية الخاصة برب العمل.
- ارتداء كامامة: على الأفراد ارتداء كامامات في جميع الأوقات أثناء وجودهم في مكان العمل لمدة ١٤ يوماً بعد التعرض الأخير.
- المسافة الاجتماعية: يجب على الفرد الحفاظ على ستة أقدام وممارسة التباعد أو المسافة الاجتماعية بقدر ما تسمح به واجبات العمل.
- التعقيم: على الفرد أن يقوم بشكل روتيني بتنظيف وتعقيم جميع المناطق بما في ذلك المعدات المشتركة.

← في حالة مرض الضابط خلال النهار وظهور أعراض تتوافق مع كوفيد-19، يجب إرساله إلى المنزل على الفور واتباع الإرشادات الخاصة بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض كوفيد-19. يجب أيضاً تحديد المعلومات المخالطين له أثناء فترة ظهور الأعراض، ويومين قبل ظهورها واعتبارهم معرضون لخطر الفيروس⁴.

■ العيش في نفس المنزل، أو كونك شريكاً حميماً أو من توفر الرعاية في مكان لا يتبع للرعاية الصحية (كالمنزل) لشخص لديه أعراض الإصابة بكوفيد-19 المثبتة مخبرياً ودون استخدام الاحتياطات الموصى بها.

■ التبادل المباشر للإفرازات إلى الأغشية المخاطية من إصابة بكوفيد-19 مثبتة مخبرياً (على سبيل المثال السعال في وجه شخص دون وجود معدات وقاية شخصية (PPE)).

اعتبارات لإجراءات الوكالة للاستجابة للمخاطر المرتفعة للتعرض للفيروس:

← لضمان استمرارية عمليات الوظائف الأساسية، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين في البنية التحتية المهمة مثل موظفي إنفاذ القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل لكوفيد-19، بشرط عدم ظهور أعراض عليهم وأن يتم تطبيق احتياطات إضافية لحمايتهم والمجتمع.

← الضباط الذين تعرضوا لكوفيد-19 لكنهم لا يزالون بدون أعراض، عليهم الالتزام بالممارسات التالية قبل وأثناء وريدي عملهم:

التعرض متدني الخطر للفيروس بحسب CDC

- لتواجد في نفس البيئة الداخلية (على سبيل المثال، غرفة التفاصيل، وغرفة انتظار المستشفى) مع شخص مصاب بأعراض كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً لفترة طويلة من الزمن ولكن لا يفي بتعريف المخالطة الوثيق. انظر أدناه لتعريف المخالطة الوثيقة.

إجراءات على الوكالة مراعاتها عند الاستجابة لحالات التعرض متدنية الخطر للفيروس:

- ← توصي مراكز السيطرة CDC بأن الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة لا يحتاجون إلى قيود من العمل⁶.
- ← يجب على هؤلاء الأفراد التحقق من درجة حرارتهم مرتين يومياً وأن يظلوا متيقظين لأعراض الجهاز التنفسي التي تتوافق مع كوفيد-19.
- ← في حالة إصابة الفرد بأعراض تتوافق مع كوفيد-19، يجب عليه عزل نفسه على الفور واتباع الإرشادات في النشرة التي تحمل عنوان إصابة ضابط إنفاذ القانون بمرض كوفيد-19.

التعرض متوسط الخطر للفيروس بحسب CDC

- مخالطة شخص عن قرب لديه أعراض كوفيد-19 مثبتة مخبرياً.
- أن تكون جالساً في سيارة تابعة للقسم مع شريك لديه أعراض ومصاحب بعدوى كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً.

إجراءات على الوكالة مراعاتها عند الاستجابة لحالات التعرض متوسطة الخطر للفيروس:

- ← اتبع اعتبارات إجراءات الوكالة لاستجابة لمخاطر التعرض المرتفعة الموضحة أعلاه⁵.

تعريف المخالطة الوثيقة

- المخالطة المطولة ضمن مسافة 6 أقدام لشخص مثبت إصابته بكوفيد-19.
- المخالطة المطولة ضمن مسافة 6 أقدام مع شخص يعاني من أعراض (تظهر عليه الحمى ويشتهي من ألام الجهاز التنفسي) وكان قد سافر إلى منطقة متأثرة بالفيروس خلال الـ 14 يوماً الماضية.

أمر يجب أخذها بالحسبان:

- ← لا يوجد إجماع على تعريف «المخالطة المطولة» لدى وكالات الصحة العامة. ما هو معروف هو أن المخالطة المطولة لا تعتمد فقط على المسافة والمدة ولكن أيضاً على مقدار معدات الحماية الشخصية التي يرتديها الضابط (إن وجدت)، ومدى قدرة الشخص المصاب على نقل العدوى، ومدى سرعة تأثره الشخص للإصابة بالعدوى.

التعرض لأوضاع لا يمكن تحديد خطرها بحسب CDC

- التفاعل مع شخص مصاب بأعراض عدوى كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً والتي لا يمكن تصنيفها كظروف مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة الخطورة المشار إليه أعلاه، كالمروور بالشخص المصاب أو التواجد لفترة وجيزة معه في نفس الغرفة.

إجراءات على الوكالة مراعاتها عند الاستجابة لحالات التعرض لأوضاع لا يمكن تحديد خطرها:

- ← توصي مراكز السيطرة CDC بأن الأفراد الذين ليس لديهم مخاطر محددة لا يحتاجون لقيود من العمل⁷.

5 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementing-safety-practices.pdf>

6 Ibid.

7 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assessment-hcp.html>



التواصل

- إتاحة الوقت الكافي للضباط للتطهير بعد التواصل ومخالطة العامة.
- تنظيف وتطهير المعدات والأماكن المشتركة وسيارات النقل بشكل متكرر.
- فكر في التأجيل عقد اجتماعات مع مجموعات المجتمع أو الطرق البديلة لها.
- السماح بالعمل غير التقليدي من المنزل للموظفين الذين تكون الحاجة لهم أقل.
- استكشاف خيارات السكن البديلة لموظفي إنفاذ القانون الذين يعملون على كل حالة على حدة للتقليل من التعرض المحتمل لكوفيد-19 لأفراد الأسرة المهددين بخطر الإصابة.
- ضع في اعتبارك سهولة الغسل وارتداء الزي الرسمي للضباط النظاميين وغسل الملابس العادية غير الرسمية وارتداء ملابس للمحققين وغيرهم ممن يرتدون ملابس أكثر رسمية.



التعقيم

- على الضباط تجنب المخالطة والاتصال المباشر مع الأفراد الذين قد يكون لديهم كوفيد-19 حتى يكون لديهم معدات الوقاية الشخصية المناسبة. قد يوفر الحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة أقدام الحماية من انتقال كوفيد-19.
- ينبغي للضباط أن يفهموا ويمارسوا معدات الوقاية الشخصية حتى يتمكنوا من تطبيق معدات الوقاية الشخصية بسرعة وأمان وإزالتها بعناية دون انتقال التلوث.
- في حالة تعرض الضابط لمرضى مشتبه بإصابته أو لفرد من الجمهور يعاني من الحمى ومرض تنفسي، على الضابط:
 - وضع الكمامة طوال الوقت أثناء التواجد في مكان العمل لمدة 14 يوماً بعد التعرض الأخير⁸.
 - تنظيف وتطهير حزام أدواته ومعداته باستخدام بخاخ التنظيف المنزلي أو المسح قبل إعادة استخدامه.
 - اتباع إجراءات التشغيل القياسية لاحتواء معدات الحماية الشخصية المستخدمة والتخلص منها.
 - اتباع إجراءات التشغيل الموحدة لاحتواء وغسل الملابس. وهذا يشمل تجنب هز أو نفخ الملابس⁹.
 - اتباع الإرشادات الخاصة بالتعرض مرتفع ومتوسط الخطر للفيروس.
- للوصول إلى الأدوات والموارد للمساعدة في الإبلاغ عن استجابة وكالتك لكوفيد-19، قم بزيارة [مكتبة الموارد CRI-TAC COVID-19](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html)، وهي مجموعة من الموارد من مجال إنفاذ القانون لمجال تطبيق القانون.

■ يجب على المتنفذين في مجال إنفاذ القانون التواصل بانتظام حول تطورات الاستجابة لكوفيد-19. وهذا يشمل التغييرات في دائرة السياسات أو الإجراءات في الرد على نداءات الخدمة، ومكالمات المساعدة الطبية والمكالمات إلى مستشفى أو مرفق طبي، وإنفاذ حركة المرور، والمزيد.

■ يجب أن تتضمن وكالات إنفاذ القانون إبلاغ التغييرات في السياسات أو الإجراءات بوضوح وأن تتعاون مع المعنيين في المجتمع. ويجب أن يشمل المعنيون في المجتمع مجموعات السلامة العامة مثل مجموعات ممثلي الموظفين، دائرة الإصلاح، ومنظمات إنفاذ القانون المحيطة، والمكاتب القضائية، وسلطات الاستجابة الأولى الأخرى، والإطفاء، وخدمات الطوارئ الطبية، وما إلى ذلك، وكذلك مجموعات المجتمع، ومراقبو الأحياء السكنية، والمجموعات الدينية، إلخ.

■ يجب أن تعمل وكالات إنفاذ القانون مع قسم الموارد البشرية لديها لتحديد آلية لتتبع عدد موظفي إنفاذ القانون الذين لا يعملون لاحتمال إصابتهم بكوفيد-19.

■ يجب أن يقدم المشرفون إرشادات واضحة للموظفين فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص باستخدام الإجازات المرضية في حالة مرض الضابط وعدم قدرته على العمل.



استراتيجيات التنفيذ

- رصد واتباع جميع التوجيهات التي تقدمها مراكز CDC ووكالات الصحة العامة للولاية والمقاطعات ووكالات الصحة المحلية.
- توسيع استجابة وكالات إنفاذ القانون لتشمل التقارير الهاتفية وتقديم التوجيه للضباط لإكمال تقرير الهاتف. التقارير الهاتفية معدة ويجب استخدامها في المخالفات التي لا تتطلب استجابة الشرطة بسبب العنف أو مخاوف تتعلق بسلامة الأرواح أو الجرائم قيد الحدوث أو الحاجة إلى جمع الأدلة.
- تقييد أو منع وصول العامة إلى أقسام الشرطة وذلك لتقليل تعرض أفراد الشرطة لكوفيد-19.
- إجراء مكالمات افتراضية أو عن بعد وتغيير الوردية لتفادي تجمع الأشخاص إن أمكن. الاستفادة من الاجتماعات في الهواء الطلق/الخارج عندما يسمح الطقس.
- توفير التدريب المناسب لاستخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) لحماية الجهاز التنفسي، إذا كانت متوفرة. شجع موظفي الوكالة على ممارسة غسل اليدين بانتظام والحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل لتوفير الحماية من انتقال كوفيد-19.

■ العيش في نفس المنزل، أو كونك شريكاً حميماً أو أنت من توفر الرعاية في مكان لا يتبع للرعاية الصحية (كالمنزل) لشخص لديه أعراض الإصابة بكوفيد-19 المثبتة مخبرياً ودون استخدام الاحتياطات الموصى بها.

■ التبادل المباشر للإفرازات إلى الأغشية المخاطية من إصابة بكوفيد-19 مثبتة مخبرياً (على سبيل المثال السعال في وجه شخص دون وجود معدات وقاية شخصية (PPE)).

■ لضمان استمرارية سير عمليات الوظائف الأساسية، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين في البنية التحتية المهمة مثل موظفي إنفاذ القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل لكوفيد-19، بشرط عدم ظهور أعراض عليهم و أن يتم تطبيق احتياطات إضافية لحمايتهم والمجتمع.

■ الضباط الذين تعرضوا لكوفيد-19 لكنهم لا يزالون بدون أعراض، عليهم الالتزام بالممارسات التالية قبل وأثناء وريديتهم:

○ **الفحص المسبق:** على أرباب العمل قياس درجة حرارة الفرد وتقييم الأعراض قبل بدء وريديتهم.

○ **المراقبة المنتظمة:** على الأفراد المراقبة الذاتية وفقاً لسياسة الصحة المهنية الخاصة برب العمل.

○ **ارتداء كامامة:** على الأفراد ارتداء كامامات في جميع الأوقات أثناء وجودهم في مكان العمل لمدة ١٤ يوماً بعد التعرض الأخير.

○ **المسافة الاجتماعية:** يجب على الفرد الحفاظ على ستة أقدام وممارسة التباعد أو المسافة الاجتماعية بقدر ما تسمح به واجبات العمل.

○ **التعقيم:** على الفرد أن يقوم بشكل روتيني بتنظيف وتعقيم جميع المناطق بما في ذلك المعدات المشتركة.

■ في حالة مرض الضابط خلال النهار وظهور أعراض تتوافق مع كوفيد-19، يجب إرساله إلى المنزل على الفور واتباع الإرشادات الخاصة بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض كوفيد-19. يجب أيضاً تحديد المعلومات المخالطين له أثناء فترة ظهور الأعراض، ويومين قبل ظهورها واعتبارهم معرضون لخطر الفيروس¹⁰.

التعرض المرتفع
لخطر للفيروس
بحسب CDC

- مخالطة شخص عن قرب لديه أعراض كوفيد-19 مثبتة مخبرياً.
- جلوسك في سيارة تابعة للقسم مع شريك لديه أعراض ومصاب بعدوى كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً.
- لضمان استمرارية سير عمليات الوظائف الأساسية ، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين في البنية التحتية المهمة مثل موظفي إنفاذ القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل لكوفيد-19، بشرط عدم ظهور أعراض عليهم و أن يتم تطبيق احتياطات إضافية لحمايتهم والمجتمع.
- الضباط الذين تعرضوا لكوفيد-19 لكنهم لا يزالون بدون أعراض، عليهم الالتزام بالممارسات التالية قبل وأثناء ودية عملهم:
 - الفحص المسبق: على أرباب العمل قياس درجة حرارة الفرد وتقييم الأعراض قبل بدء ودياتهم.
 - المراقبة المنتظمة: على الأفراد المراقبة الذاتية وفقاً لسياسة الصحة المهنية الخاصة برب العمل.
 - ارتداء كمامة: على الأفراد ارتداء كمامات في جميع الأوقات أثناء وجودهم في مكان العمل لمدة 14 يوماً بعد التعرض الأخير.
 - المسافة الاجتماعية: يجب على الفرد الحفاظ على ستة أقدام وممارسة التباعد أو المسافة الاجتماعية بقدر ما تسمح به واجبات العمل.
 - التعقيم: على الفرد أن يقوم بشكل روتيني بتنظيف وتعقيم جميع المناطق بما في ذلك المعدات المشتركة.
- في حالة مرض الضابط خلال النهار وظهور أعراض تتوافق مع كوفيد-19، يجب إرساله إلى المنزل على الفور واتباع الإرشادات الخاصة بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض كوفيد-19. يجب أيضاً تحديد المعلومات المخالطين له أثناء فترة ظهور الأعراض، ويومين قبل ظهورها واعتبارهم معرضون لخطر الفيروس¹¹.

التعرض المتوسط
الخطر للفيروس
بحسب مراكز CDC

	<ul style="list-style-type: none"> ■ توصي مراكز السيطرة CDC بأن الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة لا يحتاجون إلى قيود من العمل¹². ■ على هؤلاء الأفراد التحقق من درجة حرارتهم مرتين يومياً وأن يظلوا متيقظين لأعراض الجهاز التنفسي التي تتوافق مع كوفيد-19. ■ في حالة إصابة الفرد بأعراض تتوافق مع كوفيد-19 ، يجب عليه عزل نفسه على الفور واتباع الإرشادات في النشرة التي تحمل عنوان إصابة ضابط إنفاذ القانون بمرض كوفيد-19. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ التواجد في نفس البيئة الداخلية (على سبيل المثال، غرفة التفاصيل، وغرفة انتظار المستشفى) مع شخص مصاب بأعراض كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً لفترة طويلة من الزمن ولكن لا يفي بتعريف المخالطة الوثيق. انظر أدناه لتعريف المخالطة الوثيقة. 	<p>التعرض المتدني الخطر بحسب CDC</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ توصي مراكز السيطرة CDC بأن الأفراد الذين ليس لديهم مخاطر محددة لا يحتاجون لقيود من العمل¹³. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ التفاعل مع شخص مصاب بأعراض عدوى كوفيد-19 المؤكدة مخبرياً والتي لا يمكن تصنيفها كظروف مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة الخطورة المشار إليه أعلاه، كالمشي بجوار الشخص المصاب أو التواجد لفترة وجيزة معه في نفس الغرفة. 	<p>التعرض لأوضاع لا يمكن تحديد خطرها بحسب CDC</p>